

# RESPROXOL Syrup

**PT. AFIFARMA**  
Pharmaceutical Industries

## Packaging

Box, Bottle @ 60 ml



**AMBROXOL HCl**

## Composition

Each 5 ml Contains:  
Ambroxol HCl 15 mg

## Pharmacology

Ambroxol has secretolytic properties that can facilitate the excretion of thick and sticky secretions in the respiratory tract.

## Indication

As a secretolytic in acute and chronic airway disorders, especially in exacerbation of chronic bronchitis, asthmatic bronchitis and bronchial asthma.

## Contra Indication

Hypersensitivity to ambroxol.

## Posology

- 6-12 years: 5 ml (1 teaspoon) 2-3 times a day.
- 2-6 years: 2.5 ml (½ teaspoon) 3 times a day.
- under 2 years: 2.5 ml (½ teaspoon) 2 times a day.

## Warnings and Cautions

Ambroxol can only be used during pregnancy (especially the early trimester) and breastfeeding if it is absolutely necessary. Use during pregnancy and breastfeeding still

## Komposisi

Tiap 5 ml mengandung:  
Ambroxol HCl 15 mg

## Cara Kerja Obat

Ambroxol mempunyai sifat sekretolitik dapat mempermudah pengeluaran sekret yang kental dan lengket didalam saluran pernafasan.

## Indikasi

Sebagai sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis khususnya pada eksaserbasi bronkitis kronis, bronkitis asmatik dan asma bronkial.

## Kontra Indikasi

Hipersensitif terhadap ambroxol.

## Posologi

6-12 tahun : 5 ml (1 sendok teh) 2-3 kali sehari.  
2-6 tahun : 2,5 ml (½ sendok teh) 3 kali sehari.  
dibawah 2 tahun : 2,5 ml (½ sendok teh) 2 kali sehari.

## Peringatan dan Perhatian

Ambroxol hanya dapat digunakan selama kehamilan

requires further research. Ambroxol should not be used for a long time without consulting a doctor. In some cases of renal insufficiency, an accumulation of the metabolite Ambroxol is formed in the liver.

## Side Effect

- Intolerant reactions after administration of Ambroxol have been reported but are rare.
- Mild gastrointestinal side effects have been reported in some patients.
- Allergic reactions can occur in rare circumstances and some allergic patients also show allergic reactions to other medications. Reactions found: On the skin, facial swelling, dyspnoea, fever.
- There is no known effect on the ability to drive or operate machinery.

## Storage

Store at temperature below 30° C and protected from light

(terutama trimester awal) dan menyusui jika memang benar-benar di perlukan. Pemakaian selama kehamilan dan menyusui masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Ambroxol tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama tanpa konsultasi dokter. Dalam beberapa kasus insufisiensi ginjal, akumulasi dari metabolit Ambroxol terbentuk dihati.

## Efek Samping

- Reaksi intoleran setelah pemberian Ambroxol pernah dilaporkan tetapi jarang.
- Efek samping yang ringan pada saluran cerna pernah dilaporkan pada beberapa pasien.
- Reaksi alergi dapat terjadi dalam keadaan yang jarang dan beberapa pasien yang terkena alergi juga menunjukkan reaksi alergi terhadap obat-obat lain. Reaksi yang ditemukan : Pada kulit, pembengkakan wajah, dyspnoea, demam.
- Tidak diketahui efeknya terhadap kemampuan mengendarai atau menjalankan mesin.

## Penyimpanan

Simpan pada suhu di bawah 30° C serta terlindung dari cahaya